

¿PORQUÉ TENGO QUE TOMAR MEDICAMENTOS?

El **objetivo** de los fármacos antivirales utilizados para el tratamiento de la Hepatitis B es **impedir o frenar la replicación del virus B (VHB)**. El tratamiento reduce la capacidad de contagiar a otras personas pero no evita tomar las medidas de protección recomendadas frente a la transmisión del VHB.

El tratamiento que le ha indicado su médico es de gran importancia para su salud.

No deje de acudir a las consultas médicas programadas ni de hacerse los análisis que su médico le indique ya que son necesarias para evaluar la seguridad de los medicamentos y la acción que ejercen sobre la actividad del virus.

No suspenda el tratamiento sin comentarlo antes con el médico responsable.

¿DÓNDE CONSIGO EL TRATAMIENTO?

Este tratamiento sólo se puede adquirir en la **Farmacia del Hospital**. Si tiene preguntas acerca del tratamiento no dude en ponerse en contacto con el equipo sanitario que le está tratando.

No olvide llevar la medicación sobrante a la farmacia de su hospital en caso de que le suspendan el tratamiento.

¿CÓMO TOMAR Y GUARDAR LA MEDICACIÓN?

Si usted toma **adefovir, entecavir, lamivudina, telbivudina o tenofovir**:



- Consérvelo a **temperatura ambiente** en su envase original, en un lugar cerrado, evitando la humedad, la luz directa y el calor.
- **No guardar en el cuarto de baño o cocina** para evitar la humedad y los malos olores.
- **No debe triturar** la medicación **ni disolverla en agua u otro líquido**. Si tiene problemas para tragarla póngase en contacto con el médico o farmacéutico.



Si usted toma interferón alfa o peginterferón alfa:

- **Conservar en nevera. Nunca en congelador.**
- **Sacar inyección de la nevera 15 min. antes** de la administración para que coja temperatura y no produzca dolor al administrarla.
- Las **jeringas y agujas** son de **un solo uso**. Una vez utilizadas, tirarlas al contenedor.
- No espere a que el contenedor esté lleno. Antes de ello, entréguelo en la farmacia y se le dará otro.

¿PUEDO TOMAR ESTE TRATAMIENTO JUNTO CON MI TRATAMIENTO HABITUAL?

Informe a su **médico o farmacéutico** si está **tomando productos de herbolario u otros medicamentos**, ya sea con o sin receta para evitar la aparición de interacciones indeseables.



¿QUÉ HACER SI SE ME OLVIDA UNA TOMA?

- Si ha transcurrido **poco tiempo** desde el horario adecuado de la dosis, **tómela lo antes posible** y continúe con su horario habitual.
- Si está **más cercana la hora de la siguiente dosis, no tome la dosis olvidada** y tome la que le corresponda.

¡¡ NUNCA TOMA EL DOBLE DE MEDICACION POR HABER OLVIDADO LA DOSIS ANTERIOR!!



- Trate de **tomar** la medicación a la **misma hora**. Asóciela con una actividad común en su día a día: desayuno, almuerzo, cena.....
- Si es necesario utilice notas, alarmas, pastilleros.
- Lleve siempre **medicación** cuando **salga de casa** para evitar olvidos.
- **Informe** siempre al **médico o farmacéutico** de los **olvidos de la medicación**.

¿QUÉ OCURRE SI DEJO DE TOMAR LA MEDICACIÓN?

No deje de tomar el tratamiento sin consejo del médico que le trata la hepatitis B crónica aunque no presente síntomas y el virus se encuentre inactivo.

La interrupción indebida favorece que el virus mute y desarrolle resistencias frente al fármaco por lo que se anula el efecto de la medicación y puede poner en peligro la eficacia de tratamientos futuros.

ii EL TRATAMIENTO PROPORCIONA BENEFICIOS A LARGO PLAZO!!



*Consulta de Atención Farmacéutica
Patologías Viricas*

Unidad de Gestión Clínica de Farmacia
Consulta de Atención Farmacéutica de patologías viricas.
www.farmaciovaimecpv.com
consultas@farmaciavaimecpv.com 955015467
Área Hospitalaria de Valme

IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO DE LA HEPATITIS B